

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Respon morfologis lima genotipe memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada lima parameter namun pada parameter bobot kering tajuk memberi pengaruh yang tidak nyata.
2. Pemberian perlakuan cekaman kekeringan kapasitas lapang 100% pada tanaman padi sawah memberi pengaruh yang berbeda dengan perlakuan cekaman kekeringan 75%, 50%, dan 25%.
3. Faktor interaksi genotipe dan cekaman memberikan pengaruh terhadap parameter tinggi tanaman dan bobot kering akar.

5.2. Saran

Selain percobaan untuk mengetahui tanggap morfologis padi sawah pada fase vegetatif, perlu uji lebih lanjut mengenai respon morfologis beberapa genotipe terhadap cekaman kekeringan pada fase generatif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.