

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penambahan limbah organik yang berbeda mempengaruhi kualitas pupuk kascing sesuai standar SNI. Kandungan pupuk kascing yang terbaik terdapat pada penggunaan limbah organik kulit buah kakao dibandingkan tankos, jerami padi dan batang pisang. Kandungan limbah organik kulit buah kakao yaitu kadar air 15.73%, pH 8.44, C-organik 44.57%, N 0.77%, P 0.27% dan K 0.27%.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan perlu dilakukan penelitian lanjutan uji pupuk kascing limbah kulit buah kakao pada tanaman indikator.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.