

# PENGARUH JENIS PENGOLAHAN DAN LAMA PEMERAMAN TERHADAP KANDUNGAN FRAKSI SERAT PELEPAH KELAPA SAWIT

*by* Dewi Febrina

---

**Submission date:** 11-Jul-2020 08:59AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1355988360

**File name:** pengaruh\_jenis\_pengolahan\_pakan.pdf (267.04K)

**Word count:** 3060

**Character count:** 18163



## PENGARUH JENIS PENGOLAHAN DAN LAMA PEMERAMAN TERHADAP KANDUNGAN FRAKSI SERAT PELEPAH KELAPA SAWIT

*The Effect of Types of Processing and Different of Curing Time on Fiber Fraction of Oil Palm Fronds*

Dewi Febrina\*, Rizky Pratama, Rahmi Febriyanti

15

Faculty of Agriculture and Animal Sciences, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jln. H.R. Soebrantas Km 15.5, Pekanbaru, Riau 28293

\*E-mail: [hanna\\_suska@yahoo.com](mailto:hanna_suska@yahoo.com)

Submitted : May 26, 2020

Accepted :

### ABSTRAK

Pemanfaatan pelepah kelapa sawit sebagai pakan terkendala karena tingginya kandungan lignin. Jenis pengolahan dan lama pemeraman yang berbeda diharapkan dapat menurunkan kandungan fraksi seratnya terutama kandungan lignin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan fraksi serat pelepah kelapa sawit dengan jenis pengolahan dan lama pemeraman berbeda. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan pola faktorial dengan 2 faktor masing-masing dengan 3 ulangan sehingga terdapat 27 unit perlakuan. Faktor A adalah jenis pengolahan: A1 pengolahan secara kimia (penambahan urea 5%); A2 pengolahan secara biologis (penambahan eksreta 10%); A3 pengolahan secara kimia + biologis (penambahan 5% urea + 10% eksreta). Faktor B adalah lama pemeraman: B1 pemeraman 7 hari; B2 pemeraman 14 hari; B3 pemeraman 21 hari. Data dianalisis menggunakan analisis sidik ragam (*Analysis of Variance/ANOVA*) dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan. Hasil penelitian menunjukkan jenis pengolahan, lama pemeraman dan interaksi antara jenis pengolahan dengan lama pemeraman menurunkan kandungan selulosa dan hemiselulosa dan lignin serta meningkatkan kandungan NDF dan ADF. Perlakuan terbaik adalah kombinasi pengolahan secara kimia + biologi (penambahan urea 5% dan eksreta 10%) dengan lama pemeraman 21 hari karena menghasilkan kandungan ADL terendah yaitu 18,94%.

**Kata kunci :** Eksreta, Fraksi serat, Pemeraman, Pelepah kelapa sawit, Urea.

### ABSTRACT

The utilization of oil palm fronds as feed is constrained because of the high lignin content. Different types of processing and curing time are expected to reduce the fiber fraction content, especially lignin content. This study aims to determine the content of fiber fractions of oil palm fronds with different types of processing and ripening time. The study used a Complete Randomized Design with Factorial, 2 factors each with 3 replications so that there were 27 treatment units. Factor A is the type of processing: A1. chemical processing (5% urea addition); A2. biological processing (addition of 10% excreta); A3. chemical + biological treatment (addition of 5% urea + 10% excreta). Factor B is the duration of curing: B1. 7 days; B2. 14 days; B3. 21 days. Data were analyzed using Analysis of Variance (ANOVA) and continued with Duncan Multiple Range Test. The results showed the type of processing, curing duration, and interaction between types of processing and curing time decreased cellulose and hemicellulose and lignin content and increased NDF and ADF content. The best treatment is chemical + biological treatment (addition of 5% urea and 10% excreta) with a ripening duration of 21 days because it produces the lowest ADL content of 18.94%.

**Keywords:** Curing, Excreta, Fiber fraction, Oil palm fronds, Urea.

## PENDAHULUAN

Luas perkebunan kelapa sawit di Riau pada tahun 2017 mencapai 2.703.199 Ha, meningkat pada tahun 2018 menjadi 2.739.571 Ha (Dirjen Perkebunan, 2018). Pelepeh kelapa sawit merupakan limbah lahan dari perkebunan kelapa sawit. Peluang pemanfaatan pelepeh kelapa sawit sebagai pakan sangat besar yaitu 1,64 ton/ha/tahun bahan kering (Diyanto *et al.*, 2003), tapi terkendala dengan tingginya kandungan lignin yaitu 30,18% (Febrina, 2016).

Perlakuan secara kimia (penambahan urea), biologi (penambahan mikroorganisme) dan kombinasi kimia dan biologi dapat menurunkan kandungan lignin pelepeh kelapa sawit. Febrina *et al.*, (2020) melaporkan penambahan urea 5% pada proses fermentasi pelepeh kelapa sawit menghasilkan kandungan lignin 21,57% dan penambahan feses ayam 10% menghasilkan kandungan lignin terendah (19,94%). Penambahan urea 4% pada amoniasi pelepeh kelapa sawit menurunkan kandungan lignin (ImSYa *et al.*, 2007) dan meningkatkan kecernaan (Nurhaita *et al.*, 2007). Penambahan 4% urea dan 15% feses ayam pada fermentasi pelepeh kelapa sawit meningkatkan konsentrasi N-NH<sub>3</sub> dan kecernaan bahan kering dan bahan organik (ImSYa, 2007).

Lama pemeraman memberikan pengaruh terhadap kandungan fraksi serat. Hal ini berhubungan dengan fase pertumbuhan mikroba selama proses pemeraman. Fermentasi pelepeh kelapa sawit dengan kapang *Phanerochaete chrysosporium* selama 10 hari menurunkan kandungan NDF (Wardani, 2013; Febrina *et al.*, 2015). Terjadi peningkatan kandungan selulosa dan penurunan hemiselulosa pelepeh kelapa sawit yang difermentasi dengan *Trichoderma sp* seiring dengan meningkatnya lama pemeraman (Jaelani dkk., 2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan fraksi serat pelepeh kelapa sawit dengan jenis pengolahan dan lama pemeraman berbeda.

## MATERI DAN METODE

### Materi

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA RIAU, analisis kandungan fraksi serat dilaksanakan di Laboratorium Analisis Hasil Pertanian Fakultas Pertanian UNRI. Penelitian menggunakan bahan yang terdiri dari pelepeh kelapa sawit, urea, feses ayam dan aquadest. Alat yang digunakan adalah mesin pencacah, timbangan, plastik, selotip,

sarung tangan, ember, serta peralatan untuk analisis fraksi serat.

### Metode

Metode dilakukan dengan langkah mencacah pelepeh kelapa sawit menggunakan mesin pencacah (*leaf chopper*), mengeringkan kemudian menimbang hasil cacahan; mengeringkan eksreta ayam secara manual dengan bantuan panas matahari kemudian menggiling dengan mesin *grinder*; mencampurkan bahan berdasarkan Febrina *et al* (2020) yaitu menambahkan urea 5% dan eksreta 10% pada bak plastik sehingga semua bahan tercampur merata selanjutnya menambahkan aquadest sesuai kebutuhan; memadatkan untuk mengurangi udara dalam kantong selanjutnya plastik dilapisi sebanyak 3 lapis; proses pemeraman dilakukan sesuai dengan perlakuan yaitu pemeraman selama 7, 14 dan 21 hari, setelah pemeraman selesai membuka hasil fermentasi dan mengeringkan selanjutnya menggiling dan menganalisis kandungan fraksi serat.

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 3 x 3 dengan 3 ulangan, dengan dua faktor penelitian yaitu faktor A (jenis pengolahan) dan faktor B (lama pemeraman).

- A<sub>1</sub> : Pengolahan secara kimia (5% urea)
- A<sub>2</sub> : Pengolahan secara biologis (10% eksreta ayam broiler terdapat bakteri *Lactobacillus achidopilus*, *Lactobacillus reutri*, *Leuconostoc mesenteroides* dan *Streptococcus thermophiles* menurut Sari, 2012)
- A<sub>3</sub> : Pengolahan secara kimia dan biologis (5% urea + 10% eksreta)
- B<sub>1</sub> : pemeraman 7 hari
- B<sub>2</sub> : pemeraman 14 hari
- B<sub>3</sub> : pemeraman 21 hari

Peubah yang diukur pada penelitian ini adalah kandungan NDF, ADF, Selulosa, hemiselulosa dan lignin. Semua data dianalisis dengan analisis sidik ragam (*analysis of variance*) dan perbedaan antar perlakuan diuji dengan uji jarak berganda Duncan (*Duncan Multiple Range Test*) (Steel dan Torrie, 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan jenis pengolahan dan lama pemeraman mempengaruhi ( $P \leq 0,01$ ) kandungan fraksi serat pelepeh kelapa sawit. Terdapat interaksi ( $P \leq 0,01$ ) antara jenis

pengolahan dan lama pemeraman terhadap kandungan fraksi serat pelepah kelapa sawit, kecuali pada kandungan A<sub>3</sub> (Tabel 1).

Jenis pengolahan yang berbeda secara nyata ( $P < 0,01$ ) mempengaruhi kandungan fraksi serat pelepah kelapa sawit. Perlakuan secara kimia (penambahan urea) menyebabkan terhidrolisisnya urea menjadi ammonia sehingga pelepah kelapa sawit mengalami *swelling* yang merenggangkan ikatan lignoselulosa dan lignohemiselulosa akibatnya selulosa dan hemiselulosa terlepas dari lignin. Hidrolisis urea dapat merenggangkan ikatan lignin dan selulosa (Marjuki, 2012). Hal ini disajikan pada Tabel 1 perlakuan secara kimia (penambahan urea) menghasilkan kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin tertinggi dan sangat nyata ( $P < 0,01$ ) berbeda dibandingkan perlakuan lainnya (perlakuan biologi dan biologi dan kimia).

Perlakuan secara biologi (penambahan eksreta) menghasilkan kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin lebih rendah dibandingkan perlakuan kimia (penambahan

urea). Hal ini disebabkan karena eksreta mengandung N 2,94% (Suharyadi, 2012) yang dapat berfungsi sebagai sumber protein bagi mikroba sehingga mikroba dapat memperbanyak diri dan menghasilkan enzim lebih banyak lagi, selain itu eksreta juga mengandung Bakteri Asam Laktat (*Lactobacillus achidopilus*, *Lactobacillus reutri*, *Leuconostoc mesenteroides* dan *Streptococcus thermophilus*) (Sari, 2012) ; mengandung bakteri selulolitik  $63 \times 10^7$  cfu/g, dengan aktivitas selulase tertinggi (0,906 U/ml) pada suhu 37°C, jam ke-14 dan pH 4,48 (Febriyossa *et al.*, 2013). Jannah *et al.* (2017) juga melaporkan pada isi sekum ayam kampung jumlah bakteri selulolitik adalah  $5,3 \times 10^5$  cfu/g, lebih tinggi dibandingkan dengan yang dilaporkan Spring (1997) pada sekum ayam broiler jumlah bakteri selulolitik berkisar  $10^3$  cfu/g. Hal inilah yang diduga mempercepat penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana sehingga perlakuan secara biologis menghasilkan kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin yang lebih rendah.

Tabel 1. Kandungan Fraksi Serat Pelepah Kelapa Sawit dengan Jenis Pengolahan dan Lama Pemeraman Berbeda (*Contents of Palm Oil Midrib Fiber Fraction with Different Types of Processing and Curing Time*)

	Perlakuan Treatment	B1 (7 hari) B1 (7 days)	B2 (14 hari) B2 (14 days)	B3 (21 hari) B3 (21 days)	Rata-rata Average
Kandungan NDF (NDF Content)	A1(kimia)	57,32±0,14 <sup>AA</sup>	58,24±0,27 <sup>BA</sup>	59,00±0,22 <sup>CA</sup>	58,19 <sup>a</sup>
	A2(biologis)	57,59±0,08 <sup>AB</sup>	58,29±0,03 <sup>BA</sup>	59,43±0,10 <sup>CB</sup>	58,44 <sup>b</sup>
	A3(kimia+biologis)	57,79±0,28 <sup>AB</sup>	58,50±0,09 <sup>BA</sup>	59,70±0,14 <sup>CB</sup>	58,66 <sup>c</sup>
	Rata-rata	57,57 <sup>A</sup>	58,34 <sup>B</sup>	59,38 <sup>C</sup>	
Kandungan ADF (ADF Content)	A1(kimia)	44,58±0,10	46,02±0,29	47,69±0,25	46,09 <sup>a</sup>
	A2(biologis)	44,79±0,24	46,76±0,13	48,85±0,29	46,80 <sup>a</sup>
	A3(kimia+biologis)	45,19±0,34	47,05±0,11	49,19±0,55	47,14 <sup>b</sup>
	Rata-rata	44,85 <sup>A</sup>	46,61 <sup>B</sup>	48,44 <sup>C</sup>	
Kandungan Selulosa (Selulose Content)	A1(kimia)	22,46±0,03 <sup>CB</sup>	22,03±0,04 <sup>BC</sup>	21,14±0,02 <sup>AC</sup>	21,88 <sup>c</sup>
	A2(biologis)	22,35±0,16 <sup>AB</sup>	21,79±0,05 <sup>BB</sup>	20,89±0,05 <sup>AB</sup>	21,68 <sup>b</sup>
	A3(kimia+biologis)	22,19±0,05 <sup>CA</sup>	21,53±0,13 <sup>BA</sup>	20,05±0,21 <sup>AA</sup>	21,26 <sup>a</sup>
	Rata-rata	22,33 <sup>C</sup>	21,78 <sup>B</sup>	20,69 <sup>A</sup>	
Kandungan Hemiselulosa (Hemiselulose Content)	A1(kimia)	12,73±0,16 <sup>CA</sup>	12,23±0,34 <sup>BB</sup>	11,31±0,19 <sup>AC</sup>	12,09 <sup>c</sup>
	A2(biologis)	12,80±0,21 <sup>CA</sup>	11,53±0,11 <sup>BA</sup>	10,97±0,20 <sup>AB</sup>	11,77 <sup>b</sup>
	A3(kimia+biologis)	12,60±0,49 <sup>CA</sup>	11,45±0,19 <sup>BA</sup>	10,51±0,53 <sup>AA</sup>	11,52 <sup>a</sup>
	Rata-rata	12,71 <sup>C</sup>	11,74 <sup>B</sup>	10,83 <sup>A</sup>	
Kandungan Lignin (Lignin Content)	A1(kimia)	21,16±0,15 <sup>CB</sup>	20,29±0,04 <sup>BA</sup>	19,85±0,10 <sup>AC</sup>	20,43 <sup>c</sup>
	A2(biologis)	20,88±0,16 <sup>CB</sup>	20,15±0,08 <sup>BA</sup>	19,50±0,19 <sup>AB</sup>	20,18 <sup>b</sup>
	A3(kimia+biologis)	20,48±0,15 <sup>CA</sup>	20,03±0,02 <sup>BA</sup>	18,94±0,26 <sup>AA</sup>	19,82 <sup>a</sup>
	Rata-rata	20,84 <sup>C</sup>	20,16 <sup>B</sup>	19,43 <sup>A</sup>	

Keterangan: Superskrip huruf yang berbeda pada baris dan pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang berbeda sangat nyata ( $P < 0,01$ ) (*Different letter superscripts in the same row and column showed a very significant different effect ( $P < 0,01$ )*).

Kombinasi perlakuan kimia dan biologi (penambahan 5% urea dan 10% eksreta) menghasilkan kandungan selulosa, hemiselulosa

dan lignin terendah dan sangat nyata berbeda dengan perlakuan lainnya. Hal ini menunjukkan sinergi yang baik antara urea dan

eksreta. Eksreta juga berfungsi sebagai sumber enzim urease yang akan mempercepat penguraian urea menjadi ammonia yang akan mempercepat proses pemecahan lignoselulosa dan lignohemiselulosa sehingga selulosa dan hemiselulosa dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi mikroba.

Peningkatan lama pemeraman dari 7 hari menjadi 14 hari dan 21 hari sangat nyata ( $P < 0,01$ ) meningkatkan kandungan NDF dan ADF, tapi menurunkan kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin pelepah kelapa sawit. Hal ini berhubungan dengan fase-fase pertumbuhan mikroorganisme yang terdiri atas 4 fase yaitu fase pertumbuhan awal (*lag phase*), fase eksponensial (*log phase*), fase istirahat (*stationary phase*) dan fase kematian (*death phase*).

Pada pemeraman 7 hari, diduga bakteri berada pada fase adaptasi (*lag phase*), artinya bakteri melakukan adaptasi terhadap lingkungannya termasuk nutrisi. Populasi bakteri belum bertambah dalam jumlah yang signifikan, tetapi bakteri sudah mulai melakukan aktivitasnya dengan mengeluarkan enzim tapi dalam jumlah yang sedikit. Pada kondisi ini diduga bakteri mengeluarkan enzim selulase tapi dalam jumlah yang sedikit yang dapat memecah lignoselulosa dan lignohemiselulosa, terpecahnya lignoselulosa dan lignohemiselulosa menyebabkan selulosa dan hemiselulosa larut dan menjadi bentuk yang sederhana dan mudah dimanfaatkan sebagai sumber energinya, akibatnya kandungan selulosa dan hemiselulosa menurun. Menurunnya kandungan selulosa dan hemiselulosa menyebabkan peningkatan kandungan NDF dan ADF.

Pada hari ke-14 bakteri berada pada fase log, yaitu fase pertumbuhan cepat (eksponensial) dimana bakteri tumbuh dengan cepat dan jumlahnya juga bertambah dengan sangat cepat sehingga enzim yang dihasilkan lebih banyak. Terlihat pada Tabel 1. terjadi penurunan kandungan selulosa dan hemiselulosa dan peningkatan kandungan NDF dan ADF yang lebih tinggi pada lama pemeraman 14 hari dibandingkan pada lama pemeraman 7 hari.

Kandungan lignin pada lama pemeraman 21 hari adalah 19,43% dan nyata sangat rendah ( $P < 0,01$ ) dibandingkan lama pemeraman 14 hari dan 7 hari. Hal ini menunjukkan proses degradasi lignin oleh mikroba berlangsung cukup lama (21 hari). Lamanya proses degradasi lignin oleh mikroba disebabkan karena tingginya kandungan lignin pada pelepah kelapa sawit yaitu 30,18% (Febrina, 2016) serta kuatnya ikatan antara lignin dan selulosa serta hemiselulosa. Lignin merupakan polimer aromatik heterogen dengan

bentuk yang tetap. Ikatan kovalen dan hydrogen mengikat lignin dengan selulosa dengan kuat membentuk lignoselulosa (Xu *et al.*, 2016). Oleh sebab itu dibutuhkan waktu yang lama untuk memecah ikatan lignin dengan selulosa dan hemiselulosa. Penambahan 4% urea pada fermentasi pelepah kelapa sawit dengan lama pemeraman 21 hari menurunkan kandungan lignin (Puastuti *et al.*, 2015).

Peningkatan lama pemeraman menurunkan kandungan fraksi serat (Tabel 1). Hal ini menunjukkan semakin lama pemeraman maka aktivitas mikroba semakin besar dan semakin banyak kesempatan mikroba untuk mendegradasi pelepah kelapa sawit hingga menghasilkan kandungan lignin yang lebih rendah. Hasil yang sama dilaporkan Febrina *et al.* (2020) penambahan eksreta pada pelepah kelapa sawit dengan lama pemeraman 21 hari menghasilkan kandungan lignin 19,94%. Interaksi antara jenis pengolahan dan lama pemeraman secara nyata ( $P < 0,01$ ) meningkatkan kandungan NDF dan ADF serta menurunkan kadar selulosa, hemiselulosa dan lignin pelepah kelapa sawit fermentasi.

Kandungan lignin tertinggi terdapat pada pengolahan secara kimia dengan lama pemeraman 7 hari dan tidak berbeda dengan pengolahan secara biologi dengan lama pemeraman 7 hari. Hal ini menunjukkan pengolahan secara kimia dan biologi dengan lama pemeraman 7 hari belum maksimal mendegradasi ikatan lignoselulosa dengan lignohemiselulosa, tetapi kombinasi perlakuan kimia dan biologi secara nyata menurunkan kandungan lignin dibandingkan perlakuan kimia saja atau biologi saja.

Penambahan urea dan eksreta (kombinasi pengolahan secara kimia dan biologi) dengan lama pemeraman 21 hari menghasilkan kandungan lignin terendah yaitu 18,94% dan sangat nyata berbeda ( $P < 0,01$ ) dengan perlakuan lainnya. Hasil yang sama dilaporkan Khairunnisa (2019), penambahan 5% urea dan 10% feses ayam pada fermentasi jerami jagung dengan lama pemeraman 28 hari memberikan hasil terbaik. Hal ini menunjukkan semakin lama pemeraman semakin kompleks jenis pengolahan memberikan hasil yang lebih baik karena dapat menurunkan kandungan lignin kelapa sawit.

## SIMPULAN

Interaksi antara jenis pengolahan dan lama pemeraman menurunkan kandungan selulosa, hemiselulosa dan lignin pelepah kelapa sawit. Perlakuan terbaik adalah penambahan 5% urea dan 10% eksreta dengan lama pemeraman

21 karena menghasilkan kandungan lignin terendah yaitu 18,94%.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 40 Direktorat Jenderal Perkebunan. 2018. Statistik Perkebunan Indonesia 2017-2019 (Kelapa Sawit). Direktorat Jenderal Perkebunan. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- 13 Diwyanto, K., D. Sitompul, Mantis, I.W. Mathius, Soentoro. 2003. Pengkajian pengembangan usaha sistem integrasi kelapa sawit. *Prosiding Lokakarya Sistem Integrasi Kelapa Sawit-Sapi*, 9-10 September 2003. Hal. 11-22. Bengkulu.
- 6 Febrina, D., N. Jamarun, M. Zain dan Khasrad. 2015. Kandungan fraksi serat pelepah sawit hasil biodelignifikasi menggunakan kapang *Panerochaete chrysosporium* dengan penambahan mineral Ca dan Mn. *J. Peternakan*, 17(3): 176-186.
- 12 Febrina, D. 2016. Pemanfaatan hasil biodegradasi pelepah sawit menggunakan kapang *Phanerochaete chrysosporium* sebagai pengganti hijauan pakan pada ternak kambing. Disertasi. Universitas Andalas. Padang.
- Febrina, D., R. Febriyanti., S. I. Zam., Zumarni, J. Juliantoni and A. Fatah. 2020. Nutritional content characteristics of antimicrobial compounds from fermented oil palm fronds (*Elaeis guineensis* Jacq.). *J. of Tropical Life Science*, 10(1): 27-33.
- 2 Febriyossa, A., Nurmiati, dan Periadnadi. 2013. Potensi dan karakterisasi bakteri alami pencernaan ayam broiler pedaging (*Gallus gallus domesticus* L.) sebagai kandidat probiotik pakan ayam broiler. *J. Biologi Universitas Andalas*, 2(3): 201-106.
- Imsya, A. Fariani., H. Neny dan I.S. Ika. 2005. Level penggunaan urea dalam amoniasi pelepah sawit. Laporan Penelitian. Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Imsya, A. 2007. Konsentrasi N amonia, kecernaan bahan kering dan bahan organik pelepah sawit hasil amoniasi secara *in vitro*. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner*. Hal 111-115. Bogor.
- 7 Jaelani, A., S. Dharmawati dan B. Lesmana. 2015. Pengaruh lama penyimpanan hasil fermentasi pelepah sawit oleh *Trichoderma* sp. terhadap kandungan selulosa dan hemiselulosa. *Ziraa'ah*, 40(2): 165-174.
- Jannah, R., Safika, M. Jalaluddin, Darmawi, Farida, dan D. Aliza. 2017. Jumlah koloni bakteri selulolitik pada sekum ayam kampung. *JIMVET*, 1(3):558-565.
- Khairunnisa, N. 2019. Kualitas fisik dan kandungan nutrisi jerami jagung yang difermentasi dengan bahan aditif dan lamapemeraman yang berbeda. Skripsi. Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA RIAU. Pekanbaru.
- 6 Marjuki. 2013. Peningkatan Kualitas Jerami Padi Melalui Perlakuan Urea Amoniasi. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang.
- Musnandar, E., R.A. Muthalib, dan A. Hamidah. 2010. Pemanfaatan Pelepah Sawit sebagai Pakan Berkualitas untuk Pertumbuhan dan Kualitas Daging Kambing. *J. Penelitian Universitas Jambi: Seri Sains*, 12(2) :71-78.
- 27 Nurhaita., N. Jamarun., R. Saladin., L. Warly dan M. Zain. 2007. Efek beberapa Metoda Pengolahan Limbah Pelepah Kelapa Sawit terhadap Kandungan Gizi dan Kecernaan Secara *In-Vitro*. *J. Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia*, 2: 139-144.
- Puastuti, W., T. Haryati, dan D. Yulistiani. 2015. Kecernaan (*In vitro* dan *In sacco*) pelepah sawit yang diolah dengan penambahan urea dan enzim. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner*. 7-11 November 2015. Hal. 106-114. Jakarta.
- Sari, N. F. 2012. Identifikasi dan karakterisasi bakteri asam laktat pada kotoran ayam broiler sebagai agensi probiotik. Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Medan.
- 2 Spring, P. 1997. Understanding the Development of the Avian Gastrointestinal Microflora. In : an essential key for developing competitive exclusion products. University of Kentucky. Lexington. Pp: 149-160.
- 16 Steel, R.G.D. dan J.H. Torrie. 1992. *Pinciples and Procedures of Statistics*. McGraw-Hill Book Co. Inc. New York.
- 36 Suharyadi. 2012. Studi penumbuhan dan produksi cacing sutra (*Tubifex* sp.) dengan pupuk yang berbeda dalam sistem resirkulasi. Tesis. Universitas Terbuka. Jakarta.
- 41 Wardani, S. C. 2013. Evaluasi komponen serat hasil biofermentasi pelepah kelapa sawit (*Elaeis guineensis jacq*) dengan *phanerochaete chrysosporium* pada dosis inokulan dan lama pemeraman yang

- berbeda. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.  
Bogor.
- 22 Xu, H., B. Li, dan X. Mu. 2016. Review of alkali-based pretreatment to enhance enzymatic saccharification for lignocellulosic biomass conversion. *Industrial and Engineering Chemistry Research*, 55(32): 8691–8705

# PENGARUH JENIS PENGOLAHAN DAN LAMA PEMERAMAN TERHADAP KANDUNGAN FRAKSI SERAT PELEPAH KELAPA SAWIT

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[www.scribd.com](http://www.scribd.com)

Internet Source

2%

2

[jim.unsyiah.ac.id](http://jim.unsyiah.ac.id)

Internet Source

1%

3

[media.neliti.com](http://media.neliti.com)

Internet Source

1%

4

Judo Laksono, Wasir Ibrahim. "PENGARUH METODE PENGOLAHAN DAN WAKTU PEMERAMAN TERHADAP KUALITAS NUTRISI PELEPAH SAWIT SEBAGAI BAHAN PAKAN TERNAK KERBAU RAWA (*Buffelus asiaticus*)", JURNAL ILMIAH PETERNAKAN TERPADU, 2020

Publication

1%

5

[peterernakan-uin.com](http://peterernakan-uin.com)

Internet Source

1%

6

[scholar.unand.ac.id](http://scholar.unand.ac.id)

Internet Source

1%



7	<p>Riskha Ayuk Rihadini, S. Mukodiningsih, S. Sumarsih. "KUALITAS FISIK ORGANOLEPTIK LIMBAH TAUGE KACANG HIJAU YANG DIFERMENTASI MENGGUNAKAN <i>Trichoderma harzianum</i> DENGAN LEVEL YANG BERBEDA", JURNAL ILMIAH PETERNAKAN TERPADU, 2017</p> <p>Publication</p>	1%
8	<p><a href="http://semirata2016.fp.unimal.ac.id">semirata2016.fp.unimal.ac.id</a></p> <p>Internet Source</p>	1%
9	<p><a href="http://repository.unand.ac.id">repository.unand.ac.id</a></p> <p>Internet Source</p>	1%
10	<p>Dela Heraini, Bagus Priyo Purwanto, Suryahadi Suryahadi. "PERBANDINGAN SUHU LINGKUNGAN DAN PENGARUH PAKAN TERHADAP PRODUKTIVITAS SAPI PERAH DI DAERAH DENGAN KETINGGIAN BERBEDA", JURNAL ILMIAH PETERNAKAN TERPADU, 2019</p> <p>Publication</p>	1%
11	<p>Submitted to Syiah Kuala University</p> <p>Student Paper</p>	1%
12	<p><a href="http://scialert.net">scialert.net</a></p> <p>Internet Source</p>	1%
13	<p><a href="http://ojs.uniska-bjm.ac.id">ojs.uniska-bjm.ac.id</a></p> <p>Internet Source</p>	1%

---

14	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	1%
15	journal.ipb.ac.id Internet Source	1%
16	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
17	publikasi.polije.ac.id Internet Source	1%
18	talenta.usu.ac.id Internet Source	1%
19	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
20	Tri Rubiyanti, Wahyu Hidayat, Indra Gumay Febryano, Samsul Bakri. "Characterization of Rubberwood (Hevea brasiliensis) Pellets Torrefied with Counter-Flow Multi Baffle (COMB) Reactor", Jurnal Sylva Lestari, 2019 Publication	<1%
21	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
22	ejournal.kemenperin.go.id Internet Source	<1%
23	medpub.litbang.pertanian.go.id Internet Source	<1%

---

24	Arlen Larangahen, B. Bagau, M. R. Imbar, H. Liwe. "PENGARUH PENAMBAHAN MOLASES TERHADAP KUALITAS FISIK DAN KIMIA SILASE KULIT PISANG SEPATU ( <i>Mussa paradisiaca formatypica</i> )", ZOOTEK, 2016 Publication	<1%
25	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
26	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1%
27	info.animalproduction.net Internet Source	<1%
28	padahal-aku.blogspot.com Internet Source	<1%
29	Yusri Barokah, Arsyadi Ali, Edi Erwan. "Nutrisi Silase Pelepah Kelapa Sawit Yang Ditambah Biomassa Indigofera ( <i>Indigofera zollingeriana</i> )", Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan, 2018 Publication	<1%
30	zombiedoc.com Internet Source	<1%
31	fr.scribd.com Internet Source	<1%
32	seminar.fpp.undip.ac.id Internet Source	<1%

33

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya

Student Paper

&lt;1%

34

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Student Paper

&lt;1%

35

Yunilas Yunilas, Mulya Fauzia, Iskandar Sembiring. "Silase Komplit Pelepah Kelapa Sawit dan Indigofera sp. dengan Probiotik MOIYL Terhadap Performa Sapi PO", Journal of Livestock and Animal Health, 2019

Publication

&lt;1%

36

id.123dok.com

Internet Source

&lt;1%

37

Zaida Fairuzah, Cici Indriani Dalimunthe, Aidi Daslin. "EFEKTIVITAS BAKTERI ANTAGONIS (*Pseudomonas* sp.) UNTUK MENGENDALIKAN PENYAKIT CABANG JAMUR UPAS (*Corticium salmonicolor*)", Jurnal Penelitian Karet, 2014

Publication

&lt;1%

38

Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Student Paper

&lt;1%

39

ejournal2.unsri.ac.id

Internet Source

&lt;1%

40

H Dwiyanti, R Setyawati, Siswantoro, D Krisnansari. "Effect of feeding coconut sugar-

&lt;1%

mix coffee rich in antioxidants on blood pressure, serum SOD and MDA of sprague dawley rats", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020

Publication

41

[repository.ipb.ac.id:8080](https://repository.ipb.ac.id/8080)

Internet Source

<1%

42

[digilib.unimed.ac.id](https://digilib.unimed.ac.id)

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off